

**Приготовление и применение рабочих водных эмульсий Цифокса  
для уничтожения насекомых и клещей.**

Насекомые/ клещи	Разведение		Норма расхода рабочего раствора, мл/кв.м	Методы нанесения	Объекты, подлежащие обработке
	Количество препарата, мл	Количество о воды, мл			
Тараканы	1	250	50-100	При помощи кисти, щётки или тампона	Щели вдоль плинтусов и прилегающие к ним участки стен и пола, щели в стенах, за дверными коробками и т.п.; вдоль труб водопроводной, канализационной систем, за предметами обстановки с задней стороны
Клопы	1	500	100	При помощи кисти, щётки или тампона	Щели в стенах и мебели, за плинтусами, места отхождения обоев, обратные стороны ковров
Блохи	1	500	50	При помощи кисти, щётки или тампона	Поверхность пола, стены на высоту до 1 м., щели за плинтусами, обратные стороны ковров, дорожек и т.п.
Муравьи	1	500	50	При помощи кисти, щётки или тампона	Поверхности по путям передвижения насекомых, в местах их скопления
Крысиные клещи	1	500	50	При помощи кисти, щётки или тампона	Места проникновения и перемещения в помещении грызунов, места возможного скопления клещей: полы, стены, плинтусы, места около отопительных приборов и коммуникаций, мебель
Вши, чесоточные клещи	1	500	50	При помощи кисти, щётки или тампона	Вещи и все предметы, с которыми больной или его вещи имели контакт. <b>ЛЮДЕЙ НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ!</b>
Мухи и их личинки	1	2,5 литра	50	При помощи кисти, щётки или тампона	Места посадки мух (стёкла и рамы окон, дверные коробки)
			200-500	С помощью распыляющей аппаратуры	Места выплода личинок (твёрдые и жидкие бытовые отходы)
Осы, шершни	1	250	100-200	С помощью распыляющей аппаратуры, использовать опрыскиватели с длинными штангами	Осиные гнёзда или края мусорных контейнеров, посещаемых осами. Для открыто расположенных гнёзд – струю направляют в леток гнезда. Для гнёзд вне прямого доступа – струя направляется в места вылета ос. Обработка проводится после захода солнца или ранним утром, когда рабочие пчёлы находятся в гнезде. После того, как осы выпадут из гнезда, срезать его, завернуть в бумагу (пакет) и сжечь. Использовать ЗАЩИТНУЮ одежду НЕ яркой окраски, хорошо закрывающую голову, шею, кисти рук. Повторные обработки – не ранее чем через неделю.
Иксодовые клещи	5	1-2 литра	1-2 литра/ сотку	С помощью распыляющей аппаратуры	Перед применением средства произвести механическую расчистку участка (собрать и сжечь лесную подстилку, скосить траву). Обработать почву, газоны, низкие кустарники высотой до 50 см. Уделять внимание соблюдению сплошной обработки территории, особенно тщательно обработать периметр участка. НЕ ОБРАБАТЫВАТЬ: землю, занятую с/х культурами, детские площадки, песочницы, пасеки и т.д. Возможна повторная обработка (по факту наличия клещей), но не ранее чем через неделю
	В случае высокой численности 12	1-2 литра	1-2 литра/ сотку		
Личинки комаров	1	2,5 литра	10-30	С помощью распыляющей аппаратуры	Водоёмы закрытого типа: искусственные прудики, противопожарные и другие ёмкости, вода в которых застаивается (не используется более 5-10 дней)
			100		Открытые непроточные естественные и искусственные водоёмы: пруды, заболоченности, лужи, ямы-копанки, затопленные канавы вдоль дорог
Комары окрыленные	1	2,5 литра	50-100	С помощью распыляющей аппаратуры	Места возможной посадки и дневки: стены подвалов, сараев и пр. построек изнутри и снаружи в тенистых местах, рамы окон и дверей снаружи строений. Растительность (трава и низкие кустарники) вдоль заборов, стен строений, прибрежная растительность непроточных водоёмов (при невозможности выкашивания).